



SPRAY Oraflago[®]

(SL) ORAFLAGO[®] Spray

Pred uporabo ORAFLAGO[®] pršila, vas prosimo, da vse informacije navedene v tem insertu skrbno preberete in upoštevajte vsa navodila za uporabo. Če imate kakršnakoli dodatna vprašanja, se posvetujte z vašim zdravnikom, zobozdravnikom ali farmacevtom.

OPIS IZDELKA

ORAFLAGO[®] pršilo je učinkovito, hitro delujoče, izdelek je prenosljiv. S pomočjo aplikatorja omogoča precizno usmeritev učinkujče raztopine na poškodovanoto mesto.

INDIKACIJE

ORAFLAGO[®] pršilo vsebuje hialuronsko kislino v treh različnih molekularnih masah, kar omogoča boljšo absorpcijo v ustna tkiva. Dodane aktivne naravne sestavine zagotavljajo parodontalnemu tkivu pospešeno celjenje in hitrejšo obnovbo. Je primerna za lokalno rabo pri različnih spremembah ustnega tkiva: ustne rane, afte, razjede, stomatitis, pri ranah zaradi pušenja z oba kurirskega posegov, pri vnetilih, krvaticah ali oteklinskih dlesničih, vdrazljivih ustnih tkivih zaradi mostičkov ali slabu prileganosti protz, pri poglobljenih zobnih žepih, gingivitisu in retrakciji dlesni.

SESTAVINE

Aqua, sorbitol, lauryl glucoside, poloxamer 188 (pluracare F 68 G), tocopherol acetate, panthenol, ascorbic acid, sodium hyaluronate (<100KDa), sodium hyaluronate (1.800-2.200KDa), aloe barbadensis leaf extract trigonella foenum-graecum extract, centella asiatica extract, aesculus hippocastanum seed extract, ubiquinone, peppermint oil, melaleuca alternifolia leaf oil, triptotassium, PEG-40 hydrogenated castor oil, caprylyl glycol, glycerin, caprylylhydroxamic acid

NAVODILA ZA UPORABO

Uporabo ORAFLAGO[®] pršila priporočamo čimprej, ob prvih znakih poškodovanega tkiva.

ORAFLAGO[®] pršilo uporabite 3 krat dnevno po zagotovljeni ustni higienci (npr. čiščenje zob), razen če ni drugače predpisano. Pršilo zagotavlja enakomerno porazdelitev tekočine po vsej površini ust. Pršilo enkrat ali dvakrat razprtite na prizadeto tkivo 3 krat dnevno v obdobju 3-4 tednov dokler vsi boleznični znaki ne izginijo. Pred uporabo pretestite. Po uporabi ORAFLAGO[®] pršila priporočamo, da jste ali pijete vsaj 30 minut.

PREVIDNOSTNI UKREPI

ORAFLAGO[®] pršilo je namenjena za lokalno rabo v ustih. Ne pogoljite izdelka.

Ne uporabljajte ORAFLAGO[®] pršila v primeru alergij ali preobčutljivosti na katerokoli od navedenih sestavin v izdelku.

Za ORAFLAGO[®] pršilo ni znano, da lahko medbojno vpliva na zdravila. Izogibajte se stika z očmi. V primeru stika z očmi, temeljito splaknite oči z zadostno količino vode.

V primeru nesčetnosti, dojenja ali pri otrocih mlajših od petrajst let se za uporabo ORAFLAGO[®] pršila posvetujte s svojim zdravnikom, zobozdravnikom ali farmacevtom. Če se vaši simptomi ne izboljšajo ali celo poslabšajo, kontaktirajte zdravnika, zobozdravnika ali farmacevta.

POGOJI SHRANJEVANJA:

Hranite na sobni temperaturi, do 25°C v suhem prostoru.

Ne uporabljajte izdelka po preteku roka, ki je zapisan na embalaži. Hranite izven dosegka otrok.

(EN) ORAFLAGO[®] Spray

Prior to using ORAFLAGO[®] Spray carefully read the information contained in this leaflet and respect the instructions for use. If you have further questions, please consult your doctor, dentist or pharmacist.

PRODUCT DESCRIPTION

ORAFLAGO[®] Spray is effective, fast-working and practical to use. It's easy to carry around with you. Its multidirectional pump allows easy, precise application to the affected area.

INDICATIONS

ORAFLAGO[®] Spray solution contains hyaluronic acid composed of three different molecular weights in order to ensure better effect on the oral mucosa. The additional natural ingredients help to repair affected tissue. It is suitable for topical use on various alterations to the oral tissue including: oral lesions, ulcers, stomatitis, wounds caused by teeth extraction or surgical procedures, inflamed, bleeding or swollen gums, irritated oral tissue caused by dental bridges or poorly-fitting dentures, periodontal pockets, gingivitis and receding gums. It is particularly suited to mouth ulcers caused by mechanical injury, when it is often too painful to apply a product directly to the affected area.

INGREDIENTS

Aqua, sorbitol, lauryl glucoside, poloxamer 188 (pluracare F 68 G), tocopherol acetate, panthenol, ascorbic acid, sodium hyaluronate (400-1.000 KDa), sodium hyaluronate (<100KDa), sodium hyaluronate (1.800-2.200KDa), aloe barbadensis leaf extract trigonella foenum-graecum extract, centella asiatica extract, aesculus hippocastanum seed extract, ubiquinone, peppermint oil, melaleuca alternifolia leaf oil, triptotassium, PEG-40 hydrogenated castor oil, caprylyl glycol, glycerin, caprylylhydroxamic acid

INSTRUCTIONS FOR USE

We recommend using ORAFLAGO[®] Spray as soon as you notice any damage to the oral tissue. ORAFLAGO[®] Spray can be used three times a day following usual oral hygiene practices (e.g. brushing teeth), unless prescribed otherwise. Each spray ensures an even spread of liquid across the surface of the mouth. Spray once or twice onto the inflamed tissue over a period of 3-4 weeks, continuing until all symptoms have disappeared. Shake before use.

After using ORAFLAGO[®] Spray, we recommend waiting at least 30 minutes before eating or drinking.

CAUTIONARY MEASURES

ORAFLAGO[®] Spray is intended for topical use in the mouth. Do not use ORAFLAGO[®] Spray if you are allergic or sensitive to any of the ingredients contained in the product. ORAFLAGO[®] spray is not known to interact with other medications. Avoid contact with eyes. Should this occur, rinse eyes well with water. Consult your doctor, dentist or pharmacist prior to use if you are pregnant or breastfeeding or for children younger than 15 years of age. If symptoms do not improve or get worse, contact your doctor, dentist or pharmacist.

STORAGE INSTRUCTIONS:

Store in a dry place at room temperature (up to 25°C). Do not use the product after the date shown on the packaging. Store out of reach of children. Store the bottle in an upright position.

(D) ORAFLAGO[®] Spray

Vor der Verwendung von ORAFLAGO[®] Spray, diese Informationen sorgfältig lesen und die Gebrauchsanweisung beachten. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Zahnarzt oder Apotheker.

PRODUKTBESCHREIBUNG

ORAFLAGO[®] Spray ist effektiv, schnell und praktisch einsetzbar. Es ist leicht, sie immer bei sich zu haben. Seine multidirektionale Pumpe ermöglicht eine einfache und präzise Anwendung auf den betroffenen Bereich.

INDIKATIONEN

ORAFLAGO[®] Sprühlösung enthält Hyaluronsäure aus drei verschiedenen Molekulargewichten, um eine bessere Absorption in das Mundschleimhaut zu gewährleisten. Die zusätzlichen natürlichen Inhaltsstoffe verkürzen die Zeit, in der das Parodontalgewebe heilt und sich selbst repariert. Es eignet sich für die topische Anwendung bei verschiedenen Veränderungen des Mundgewebes, einschließlich: orale Läsionen, Geschwüre, Stomatitis, Wunden die durch Zahntfernung oder chirurgische Eingriffe verursacht werden, entzündeten, blutenden oder geschwollenen Zahnfleisch, gereiztes Mundgewebe durch Zahnbrücken oder schlecht sitzende Prothesen, Parodontale Taschen, Gingivitis und körniges Zahnfleisch. Es eignet sich besonders für Läsionen, die durch mechanische Verletzungen verursacht werden, und es ist oft zu schmerhaft, ein anderes Produkt direkt auf die betroffene Stelle aufzutragen.

INHALTSSTOFFE:

Aqua, Sorbitol, Laurylpolyglucose, Poloxamer 188, Tocopherylacetat, Panthenol, Ascorbinsäure, Natriumhyaluronate mit unterschiedlichen Molekulargewichten, Aloe barbadensis trigonella foenum-graecum-Blattextrakt, Indischer Wassernabel-Extrakt, Aesculus Hippocastanum Samenextrakt, Ubichinon, Pfefferminzöl, Teebaumöl, Trikaliumcitrat, PEG-40 hydriertes Ricinusöl, Caprylylglycerol, Glycerin, Caprylylhdroxamsäure

GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir empfehlen die Verwendung von ORAFLAGO[®] Spray, sobald Sie eine Reizung des Mundgewebes fühlen.

ORAFLAGO[®] Spray kann dreimal täglich nach üblichen Mundhygienepraktiken (z. B. Zahnpflegemitteln) verwendet werden, sofern nicht anders angegeben. Jeder Sprayschuss sorgt für eine gleichmäßige Ausbreitung von Flüssigkeit über die Oberfläche der Mundschleimhaut. Sprühen Sie ein- oder zweimal auf das entzündete Gewebe, bis alle Symptome verschwunden sind. Vor Gebrauch schütteln. Nach der Verwendung von ORAFLAGO[®] Spray empfehlen wir, mindestens 30 Minuten mit der Einnahme von Speisen und Getränken zu warten.

VORSICHTSMASSNAHMEN

ORAFLAGO[®] Spray ist für den topischen Einsatz im Mund gedacht.

Bei bekannten allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Inhaltsstoffe, sollte ORAFLAGO[®] Spray nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen von ORAFLAGO[®] Spray mit anderen Medikamenten sind nicht bekannt. Den Kontakt mit den Augen vermeiden. Sollte dies der Fall sein, spülen Sie die Augen gut mit Wasser. Fragen Sie Ihren Arzt, Zahnarzt oder Apotheker vor der Anwendung, wenn Sie schwanger sind oder stillen oder für Kinder unter 15 Jahren.

Wenn sich die Symptome nicht verbessern oder verschlimmern, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Zahnarzt oder Apotheker.

LAGERUNGSHINWEISE:

Bei Raumtemperatur (bis 25 °C) trocken lagern. Verwenden Sie das Produkt nicht nach dem auf der Verpackung angegebenen Datum.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Lagern Sie die Flasche in einer aufrechten Position.

(F) L'ORAFLAGO[®] Spray

Avant d'utiliser le spray ORAFLAGO[®], lisez attentivement les informations contenues dans cette notice et respectez les instructions d'utilisation. Si vous avez d'autres questions, veuillez consulter votre médecin, votre dentiste ou votre pharmacien.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le spray ORAFLAGO[®] est efficace, rapide et pratique à utiliser. Il est facile à transporter avec vous. Sa pompe multidirectionnelle permet une application facile et précise sur la zone touchée.

LES INDICATIONS

La solution de pulvérisation ORAFLAGO[®] contient de l'acide hyaluronique composé de trois poids



SPRAY Oraflogo®

moléculaires différents afin d'assurer une meilleure absorption par la muqueuse bucale. Les ingrédients naturels supplémentaires accélèrent le rythme auquel le tissu parodontal guéri et se répare. Il est approprié pour une utilisation topique sur diverses altérations du tissu buccal, y compris : lésions buccales, ulcères, stomatites, plaies causées par l'extraction des dents ou des interventions chirurgicales, enflammés, saignements ou gencives gonflées, tissus oraux irrités causés par des ponts dentaires ou prothèses dentaires mal ajustées, les poches parodontales, la gingivite et les gencives reculées. Il est particulièrement adapté aux ulcères buccaux causés par des blessures mécaniques, alors qu'il est souvent trop pénible d'appliquer directement un produit sur la zone affectée.

INGRÉDIENTS

Aqua, sorbitol, lauryl polyglucoside, poloxamère 188, acétate de tocophérol, panthénol, acide ascorbique, hyaluronate de sodium (faible poids moléculaire), hyaluronate de sodium (poids moléculaire moyen), hyaluronate de sodium (poids moléculaire élevé), extrait de feuille d'aloë barbadensis extrait de trigonella foenum-graecum, extrait de centella asiatica, L'extrait de graines d'acanthus hippocastanum, l'ubiquinone, l'huile de menthe poivrée, l'huile de feuille de melaleuca alternifolia, le citrate de tripotassium, l'huile de ricin hydrogénée PEG-40, le caprylyl glicol, la glycérine, l'acide caprylylhdroxamic.

MODE D'EMPLOI

Nous vous recommandons d'utiliser le spray ORAFLAGO® dès que vous remarquez des dommages du tissu buccal.

La pulvérisation ORAFLAGO® peut être utilisée trois fois par jour suivant les pratiques habituelles d'hygiène bucco-dentaire (par exemple, broser les dents), sauf indication contraire. Chaque spray assure une propagation uniforme du liquide sur la surface de la bouche. Pulvérisez une ou deux fois sur le tissu enflammé sur une période de 3-4 semaines, jusqu'à ce que tous les symptômes aient disparu. Agitez avant emploi.

Après avoir utilisé le spray ORAFLAGO®, nous vous recommandons d'attendre au moins 30 minutes avant de manger ou de boire.

MESURES ATTENTIVES

La pulvérisation ORAFLAGO® est destinée à une utilisation topique dans la bouche.

Ne pas utiliser ORAFLAGO® si vous êtes allergique ou sensible à l'un des ingrédients contenus dans

le produit. La pulvérisation ORAFLAGO® n'est pas connue pour interférer avec la prise d'autres médicaments. Éviter le contact avec les yeux. Si cela se produit, rincer les yeux avec de l'eau. Consultez votre médecin, votre dentiste ou votre pharmacien avant d'utiliser si vous êtes enceinte, allaitez ou pour les enfants de moins de 15 ans. Si les symptômes ne s'améliorent pas ou ne s'aggravent pas, contactez votre médecin, votre dentiste ou votre pharmacien.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE:

Conserver dans un endroit sec à température ambiante (jusqu'à 25 °C). N'utilisez pas le produit après la date indiquée sur l'emballage. Conserver hors de la portée des enfants.

Rangée la bouteille en position verticale.

ORAFLOGO® Spray

Prima di utilizzare ORAFLAGO® Spray leggere attentamente le informazioni contenute in questo foglio e rispettare le istruzioni per l'uso. Se avete ulteriori domande, si prega di consultare il proprio medico, dentista o farmacista.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ORAFLAGO® Spray è efficace, veloce-lavoro e pratico da usare. È facile da portare in giro con voi. La sua pompa multidirezionale consente una facile e precisa applicazione del prodotto sull'area interessata.

INDICAZIONI

ORAFLAGO® Spray è una soluzione che contiene acido ialuronico di tre diversi pesi molecolari al fine di garantire una migliore efficacia sulla mucosa orale. Gli ingredienti naturali aggiuntivi accelerano i processi rigenerativi di guarigione dei tessuti parodontali. È adatto per uso topico su varie alterazioni al tessuto orale quali: lesioni orali, ulcere, stomatite, ferite causate da estrazioni di denti o da procedure chirurgiche, infiammazioni, sanguinamento o gengive gonfie, tessuto orale irritata a causa di ponti dentali o protesi, tasche parodontali, gengiviti e gengive sanguinanti. Eso è particolarmente adatto per alte cause da lesioni meccaniche, quando è spesso troppo doloroso applicare un prodotto direttamente sulla zona interessata.

INGREDIENTI

Aqua, sorbitolo, vitamina e acetato, pantenolo, sodio ialuronato (basso peso molecolare), sodio ialuronato (medio peso molecolare), sodio ialuronato (alto peso molecolare), estratto di aloë barbadensis estratto di trigonella foenum-graecum, estratto di centella asiatica, estratto di ippocastano, coenzima q10, menta piperita olio essenziale, melaleuca alternifolia foglia olio essenziale.

(alto peso molecolare), estratto di aloë barbadensis estratto di trigonella foenum-graecum, estratto di centella asiatica, estratto di ippocastano, coenzima q10, menta piperita olio essenziale, melaleuca alternifolia foglia olio essenziale.

ISTRUZIONI PER L'USO

Si consiglia di utilizzare ORAFLAGO® Spray non appena si nota un danno al tessuto orale.

ORAFLAGO® spray può essere usato tre volte al giorno secondo le comuni pratiche di igiene orale (ad esempio lavarsi i denti), a meno che non prescritto diversamente. Ogni spruzzo assicura una distribuzione uniforme del liquido attraverso la superficie della bocca. Spruzzare una o due volte sul tessuto infiammato per un periodo di 3-4 settimane, continuando fino a quando tutti i sintomi sono scomparsi. Agitare prima dell'uso. Dopo aver utilizzato ORAFLAGO® spray si consiglia di attendere almeno 30 minuti prima di mangiare o bere.

PRECAUZIONI D'USO

ORAFLAGO® spray è destinato ad uso topico in bocca.

Non utilizzare ORAFLAGO® spray se siete allergici o sensibili ad uno qualsiasi degli ingredienti contenuti nel prodotto.

Non sono note interazioni fra ORAFLAGO® spray con altri farmaci.

Evitare il contatto con gli occhi. Se ciò dovesse accadere, sciacquare gli occhi con acqua.

Consultare il proprio medico, dentista o al farmacista prima dell'utilizzo in caso di gravidanza, durante l'allattamento o per i bambini di età inferiore ai 15 anni di età.

Se i sintomi non migliorano o peggiorano, contattare il medico, dentista o il farmacista.

ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE:

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente (fino a 25 °C). Non utilizzare il prodotto dopo la data indicata sulla confezione. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare la bottiglia in posizione verticale.

CRO ORAFLAGO® Gel

Prije korištenja ORAFLAGO® spreja pažljivo pročitajte informacije sadržane u ovoj uputi i pridržavajte se uputa za uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, stomatologu ili ljekarniku.

OPIS PROIZVODA

ORAFLAGO® sprej je učinkovit, brzo djeluje i praktičan za korištenje. Lako se nosi sa sobom. Njegova višesmjerna pumpa omogućava jednostavnu i preciznu aplikaciju na zahvaćenu području.

INDIKACIJE

ORAFLAGO® sprej sadrži hijaluronsku kiselinsku u trsi

različite molekulare težine i dodatnih prirodnih sastojaka. Pogodan je za površinski primjenu na raznim promjenama tkiva u usnoj supljini, uključujući: oralne lezije, čireve, stomatitis, rane uzrokovane vađenjem zuba ili kirurškim zahvatom, upale, krvarenja ili otjecani desni, irritation oralnog tkiva uzrokovanih Zubnim mostovima ili loše postavljenih proteza, džepovi, gingivitis i povlačenje zuba u mesu. Posebno je pogodan za čireve u ustima uzrokovane mehaničkim ozljedama, kada je previše bolno primijeniti proizvod direktno na zahvaćenu područja.

SASTOJCI

Aqua, sorbitol, lauryl polyglucoside, poloxamer 188, tokoférol acetat, pantenol, askorbinska kiselina, natrijev hijaluronat niske molekulare težine, natrijev hijaluronat srednje molekulare težine, natrijev hijaluronat visoke molekulare težine, ekstrakt lista aloë barbadensis eksrakt trigona na foenum-graecum, ekstrakt Centella asiatica, ekstrakt sjemenki Aesculus hippocastanum, ubikinon, ulje paprene metvice, ulje lista Melaleuca alternifolia, trikalijevi citrat, PEG-40 hidrogenirano ricinusovo ulje, caprylyl glicol, glicerin, caprylylhydroxamic kiselina.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Preporučamo korištenje ORAFLAGO® spreja čim primijetite bilo kakvu promjenu na sluznicu usne supljine.

ORAFLAGO® sprej se može koristiti tri puta dnevno nakon uobičajene oralne higijene (npr. pranja zuba), osim ako nije drukčije propisano. Sprej sprej osigurava ravnomjerno nanoseњe tekućine po cijeloj površini usta. Sprej korištit jednom ili dva puta na upaljenom tkivu tokom perioda od 3-4 tjedana sve dok svi simptomi nestanu. Protresite prije upotrebe.

Nakon korištenja ORAFLAGO® spreja preporučujemo da pričekate barem 30 minuta prije jela ili pića.

MJERE OPREZA

ORAFLAGO® sprej namijenjen je za topikalnu primjenu u ustima. Ne koristite ORAFLAGO® sprej ako ste alergični ili osjetljivi na bilo koji od sastojaka sadržanih u proizvodu. Za ORAFLAGO® sprej nisu poznate interakcije s drugim lijekovima. Izbjegavati kontakt s očima. Ako se dogodi, isperite oči vodom. Obratite se svom liječniku, stomatologu ili ljekarniku prije upotrebe ako ste trudni ili dojite, ili da djecu mlađu od 15 godina. Ako se simptomi ne poboljšaju ili se pogoršaju, obratite se liječniku, stomatologu ili ljekarniku.

UPUTE O ČUVANJU:

Čuvajte na suhom mjestu pri sobnoj temperaturi (do 25 °C). Nemojte korištiti proizvod nakon datuma otisnutog na ambalaži. Čuvati izvan dohvata djece.

Čuvajte bočicu u uspravnom položaju.

Contents: 30ml C E 25°C

Manufacturer: medicinalis⁺ Production of pharmaceutical products d.o.o., Savska cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenia

Distributors: Österreich - Panacea d.o.o., St. Veiter Strasse 34/II, A-9020 Klagenfurt, Schweiz - W3 Solution Saar, Route du Bois-des-iles 109, 1290 Versoix, Danmark - Medic Denmark A/S, Korskildelund 4, DK-2670, CR a SR: EuroMD s.r.o., Na Flře 2, 14300 Praha4, CR, Slovenija - Panacea d.o.o., Savska cesta 10, 1000 Ljubljana, Hrvatska: NEMEC PHARMACIA D.O.O., Dr.Franje Tuđmana 1, 1043 Bestovje.

This leaflet was updated: 23.08.2017

www.oraflogo.com