

Uporaba / Upotreba

Novalac PLUS začetno mleko je primerno za dojenčke od rojstva do 6. meseca starosti, ko jih matere ne dojijo ali so le ti delno dojeni. Uporabljajte ga lahko vse dokler otroka hranite po steklenički. Ko Novalac PLUS začetno mleko več ne nasiti dojenčka, svetujemo, da preidete na Novalac 1 začetno mleko. Po dopolnjenem 6. mesecu starosti svetujemo prehod na Novalac 2 nadaljevalno mleko. Novalac PLUS je del obsežne linije proizvodov, razvitih posebej za zadovoljevanje prehranskih zahtev dojenčkov. / Novalac PLUS početna mliječna hrana primjerena je za hranjenje dojenčadi od rođenja do 6. mjeseca starosti, ako majka ne doji ili ako djelomično doji. Možete ju koristiti sve dok dojenče hranite na bočicu. Ako Novalac PLUS početna mliječna hrana dovoljno ne zasitiše dojenče, savjetujemo da prijedete na Novalac 1 početnu mliječnu hranu. Nakon 6 mjeseci starosti preporučujemo prijelaz na Novalac 2, prijelaznu mliječnu hranu. Novalac PLUS dio je opsežne linije proizvoda posebno razvijenih za zadovoljavanje prehranbenih potreba dojenčadi.

Pomembno opozorilo / Važna napomena

Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke. Mleko Novalac se uporablja samo po nasvetu strokovnjakov s področja medicine, prehrane, farmacije ali druge strokovne osebe, ki je odgovorna za skrb matere in otroka. Posebna pozornost pri uporabi Novalac mleka je potrebna pri dojenčkih z oslabiljenim imunskim odzivom, nedonošenčkih ali novorojenčkih z nizko porodno težo ter v primeru alergijskih reakcij na mlečne beljakovine. Nepravilna priprava ali shranjevanje lahko predstavlja tveganje za zdravje. Pri hranjenju po steklenički poskrbite, da stik med mlekom in zobmi vašega otroka ni predolg ali pogost, ker to povečuje možnost za nastanek kariesa. Vedno umijte zobe vašega otroka po zadnjem nočnem obroku. / Majčino mleko najbolja je hrana za dojenčad. Mliječna hrana za dojenčad koristi se samo prema preporukama stručnjaka s područja medicine, prehrane, farmacije ili druge stručne osobe odgovorne za zdravlje majke i djeteta. Poseban oprez kod upotrebe mliječne hrane Novalac potreban je kod dojenčadi s oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porodne težine te kod alergijskih reakcija na mliječne bjelancevine. Nepravilna priprema ili čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Pri hranjenju na bočicu pazite da kontakt između mliječne hrane i zuba vašega djeteta ne bude predug ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvijek operite zube djetetu nakon zadnjeg noćnog obroka.

Odmerjanje / Doziranje

Starost dojenčka (mesece) / Starost dojenčeta (mjeseci)	0-1	1-2	2-4	4-6
Število obrokov na dan / Broj obroka na dan	6	5	5	4
Število meric za pripravo enega obroka / Broj mjerica za pripremu jednog obroka	3	4	5	7
Količina vode (ml) / Količina vode (ml)	90	120	150	210

Do vrha napolnjena in do roba poravnana priložena merica vsebuje 4,3 g Novalaca PLUS. Eno merico raztopite v 30 ml vode. Dnevno količino hrane in število obrokov prilagodite dojenčkovi starosti in njegovim potrebam. Če zdravnik ne svetuje drugače, upoštevajte priporočila v tabeli. / Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena mjerica sadržava 4,3 g Novalaca PLUS. Jednu mjericu rastopite u 30 ml vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama dojenčeta. Ako liječnik drugačije ne savjetuje, uvažite preporuke u tablici.

- Vedno pripravite svež obrok.
- Hranite na suhem mestu, zaščiteno pred toploto in svetlobo.
- Izdelek je uporaben najmanj do datuma, odtisnjene na dnu pločevinke.
- Po prvem odprtju pločevinke, morate vsebino porabiti v treh tednih.
- Po vsaki uporabi pločevinke dobro zaprite.
- Ne shranjujte nepoptitega obroka. Ostanek zavrzite. /
- Uvijek pripremite sveži obrok.
- Čuvajte na suhom mestu, zaščiteno od svetla i topline.
- Proizvod je najbolje upotrijebiti do datuma otisnutog na dnu limenke.
- Nakon prvog otvaranja limenke sadržaj upotrijebite u roku od 3 tjedna.
- Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.
- Ne čuvajte nepopijeni obrok. Ostatak bacite.

Pakirano v kontrolirani atmosferi. / Pakirano u kontroliranoj atmosferi.
Sedež podjetja: UP Med-Europa SA, Švica • Distributer: Medis, d.o.o., Bmčeva 1, Ljubljana
Sjedište poduzeća: UP Med-Europa SA, Švicarska • Kontakt za Hrvatsku: Medis Adria d.o.o., Kolarova 7, Zagreb.



MEDIS | www.novalac.si
www.novalac.hr

* Kotzacheva zakonodaja za vse začetne formule za dojenčke/kako je propisano zakonodavstvom za svu početnu hranu za dojenčad

Novalac PLUS

Začetno mleko za dojenčke
Početna mliječna hrana
za dojenčad

Vsebuje DHA*
Sadržava DHA*



0-6 mesecev/
mjeseci

400 g e

Hranilna vrednost / Hranjiva vrijednost

	100 g	100 ml
Energijska vrednost/Energetska vrijednost	kJ	2118 275
	kcal	506 66
Maščobe/Masti	g	26 3,4
- od tega nasičene maščobe/	g	12 1,6
- od kojih zasićene masne kiseline		
- linolna kislina/linolna kiselina	g	4,5 0,6
- alfa linolenska kislina/alfa linolenska kiselina	mg	405 53
- DHA (dokozaheksaenjska kislina/	mg	120 16
dokozahexaenska kiselina)		
- ARA (arahidonska kislina/arahidonska kiselina)	mg	60 8
Ogljikovi hidrati/Ugljikohidrati	g	56,8 7,4
- od tega sladkorji /od kojih šećeri	g	56,8 7,4
GOS (Galaktooligosaharidi)	g	1,9 0,2
Prehranske vlaknine/Vlakna	g	1,3 0,2
Beljakovine/Bjelancevine	g	10,4 1,4
Vitamins		
A	µg	440 57
D	µg	11,2 1,5
E	mg	8,7 1,1
K	µg	60 7,8
C	mg	60 7,8
Tiamin	mg	0,8 0,10
Riboflavin	mg	1,2 0,2
Niacin	mg	4,5 0,6
B6	mg	0,5 0,07
Folna kislina/Folna kiselina	µg	80 10
Folat	µg-DFE	150 20
B12	µg	1,5 0,2
Biotin	µg	18 2,3
Pantotenska kislina/Pantotenska kiselina	mg	5 0,7
Minerali		
Natrij	mg	165 21
Kalij	mg	525 68
Klorid	mg	400 52
Kalci	mg	380 49
Fosfor	mg	240 31
Magnezij	mg	45 5,9
Železo/Željezo	mg	4 0,5
Cink	mg	3,3 0,4
Baker/Bakar	mg	0,38 0,05
Mangan	mg	0,045 0,006
Fluorid	mg	<0,45 <0,06
Selen	µg	22 2,9
Jod	µg	95 12
Holin/Kolin	mg	170 22
Inozitol	mg	80 10,4
Taurin/Taurin	mg	40 5,2
L-karnitin	mg	20 2,6
Nukleotidi	mg	18,6 2,4

Sestavine / Sastojci

Posneto mleko, mlečne beljakovine, rastlinska olja (palмово, kokosovo, sojino, repično), laktosa, galaktooligosaharidi (mleko), ribje olje (DHA), emulgator (sojin lecitin), trikalijev citrat, olje iz gljive Mortierella alpina (ARA), L-tirozin, kalcijev klorid, trikalijev citrat, olje iz gljive Mortierella alpina (ARA), L-tirozin, vitamini (retinilacetat, tiaminijev hidroksid, gancokobalmin, riboflavin, piridoksinijev hidroksid, natrijev-L-askorbat, holekalciferol, DL-alfa-tokoferil acetat, fitomenadion, D-biotin, folna kislina, nikotinamid, kalcijev D-pantotenat), natrijev klorid, železov difosfat, taurin, trikalijev citrat, kalcijev hidroksid, inozitol, L-triptofan, magnezijev klorid, magnezijev oksid, nukleotidi (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-karnitin, cinkov sulfat, kalcijev jodid, antioksidanti (ekstrakt bogat s tokoferoli, askorbil palmitat), natrijev selenit, bakrov sulfat, manganov sulfat. / Otvorano mliječno, mliječne beljakovine, biljna ulja (palmino, kokosovo, sojino, ulje uljane repice), laktaza, galaktooligosaharidi (mlijeko), riblje ulje (DHA), emulgator (sojin lecitin), trikalijev citrat, kalcijev klorid, kolin bicitrat, trikalijev fosfat, kalcijev klorid, trinatrijev citrat, ulje gljive Mortierella alpina (ARA), L-tirozin, vitamini (retinil-acetat, tiamin-hidroksid, cijanokobalmin, riboflavin, piridoksin-hidroksid, natrijev-L-askorbat, kolekalciferol, DL-alfa-tokoferil acetat, fitomenadion, D-biotin, folna kiselina, nikotinamid, kalcijev D-pantotenat), natrijev klorid, željezov difosfat, taurin, trikalijev citrat, kalcijev hidroksid, inozitol, L-triptofan, magnezijev klorid, magnezijev oksid, nukleotidi (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-karnitin, cinkov sulfat, kalcijev jodid, antioksidansi (ekstrakt bogat tokoferolima, askorbil palmitat), natrijev selenit, bakrov sulfat, manganov sulfat.

Navodila za pripravo / Uputa za pripremu

- PRED VSAKO PRIPRAVO OBROKA SI UMIJTE ROKE. / PRIJE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKU.**
1 Stekleničko in pokrovček z dušo prekuhajte v vodi. Vre naj vsaj 5 minut. / Bočicu i poklopac sa dušom prokuhajte u vodi. Neka ključa bar 5 minuta.
- 2 Vodo za pripravo obroka zavrite v pokritem lončku. Vre naj vsaj 5 minut. / Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokrivenom lončiću. Neka ključa bar 5 minuta.
- 3 Vodo v lončku ohladite na 40 °C in jo prelajte v stekleničko. / Vodu u lončiću ohladite na 40°C i prelajte je u bočicu.
- 4 V stekleničko s priloženo merico vsujite predpisano število meric. / Uspite ubočicu propisani broj mjerica pomoću priložene mjerice.
- 5 Stekleničko zaprite in dobro pretresite, da se prašek popolnoma raztopi. / Bočicu zatvorite i dobro promuckajte da se prašak potpuno otopi.
- 6 Pripravljen obrok ohladite do mlačnega (37 °C), oz. dokler na koži ne čutite ne toplo ne hladno. / Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37°C), odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.