

Active



Cool Gel 100 ml

Upute za uporabu / Navodilo za uporabo

Što je Perskindol Active Cool Gel i za što se koristi?

Perskindol Active Cool Gel je gel s učinkom hlađenja za utrljavanje koji sadrži mentol. Primjena **Perskindol Active Cool Gel-a** pomaže u ublažavanju boli kod sportskih ozljeda, smanjuje oticanje i pomaže u zacjeljivanju sportskih ozljeda.

Perskindol Active Cool Gel se posebice preporučuje u slučaju sportskih ozljeda poput: istegnuća, nategnutosti mišića, puknuća mišića, uganuća, modrica i iščašenja.

Što sadrži Perskindol Active Cool Gel?

Sastav: Aqua, Isopropyl alcohol, Menthol, Carbomer, Menthyl lactate, Tromethamine, Citrus limon peel oil, Mentha piperita oil, CI 42051, Limonene, Linalool, Citral, Geraniol.

Kako primjenjivati Perskindol Active Cool Gel?

Odrasli i djeca starija od 5 godina: primijeniti u tankim slojevima na zahvaćena područja 3–4 puta dnevno. Može se primijeniti na rukama, laktovima, zapešćima, šakama, vratu, leđima, ramenima, nogama, koljenima, gležnjevima i stopalima.

Važne informacije

Ne primjenjivati **Perskindol Active Cool Gel** u slučaju poznate preosjetljivosti na bilo koje sastojke prethodno navedene.

Ne primjenjivati na otvorene rane i oko očiju. U slučaju kontakta s očima, oči temeljito isprati vodom.

Ne upotrebljavati sa zavojima i ne pokrivati.

Perskindol Active Cool Gel je dizajniran da djeluje učinkovito uz laganu primjenu. Kod nekih osoba se može pojaviti blaga iritacija ako se gel presnažno utrljava u kožu.

Nakon kontinuirane primjene u trajanju više od 21 dan, preporučuje se pauza u trajanju od 3 dana.

Ne smije se primjenjivati u djece mlađe od 5 godina. Čuvati izvan dohvata djece. Iz predostrožnosti, ne primjenjivati tijekom trudnoće ili dojenja.

Ako se pojave bilo kakve neželjene nuspojave, prestanite s primjenom proizvoda. Ako se simptomi nastave, obratite se ljekarniku ili liječniku.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Nakon svake primjene pravilno zatvorite tubu.

Perskindol Active Cool Gel se može koristiti do datuma označenog s oznakom «EXP» na pakiranju.

Ova Uputa za uporabu je zadnji put revidirana u travnju 2023.

Proizvedeno u Švicarskoj

Proizvođač: VERFORA SA, Rte de Moncor 12, 1752 Villars-sur-Glâne, Švicarska

Kontakt za Republiku Hrvatsku:

Ewopharma d.o.o., Jadranska avenija 9, 10020 Zagreb
+385 1 6646-563, www.perskindol.hr



Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG
Wolfgangasse 45-47, AT-1121 Wien

Kaj je Perskindol Active Cool Gel in kdaj ga uporabljamo?

Perskindol Active Cool Gel je hladilni gel za vtiranje, ki vsebuje mentol.

Perskindol Active Cool Gel pomaga pri lažšanju bolečin zaradi športnih poškodb, zmanjševanju oteklin in pomaga pri zdravljenju športnih poškodb.

Uporaba izdelka **Perskindol Active Cool Gel** je zelo priporočljiva v primeru športnih poškodb, kot so nategnjene mišice, natrgane mišice, zvini, podplutbe in izpahi.

Kaj vsebuje Perskindol Active Cool Gel?

Sestavine: Aqua, Isopropyl alcohol, Menthol, Carbomer, Menthyl lactate, Tromethamine, Citrus limon peel oil, Mentha piperita oil, CI 42051, Limonene, Linalool, Citral, Geraniol.

Kako uporabljati Perskindol Active Cool Gel?

Odrasli in otroci, starejši od 5 let: 3 do 4-krat na dan nanesite v tankih slojih na prizadeto območje. Gel se lahko uporablja na rokah, komolcih, zapestjih, dlaneh, vratu, hrbtu, ramah, nogah, kolenih, gležnjih in stopalih.

Pomembne informacije

Izdelka **Perskindol Active Cool Gel** ne uporabljajte v primeru znane preobčutljivosti ali alergije na katero koli od sestavin, navedenih zgoraj.

Ne nanašajte na odprte rane ali na kožo okrog oči. Če izdelek pride v stik z očmi, jih dobro sperite z vodo.

Namazanih predelov ne povijajte in ne prekrivajte.

Perskindol Active Cool Gel ima sestavo, ki je učinkovita ob zmerni uporabi. Pri nekaterih osebah se ob preveč močnem vtiranju gela v kožo lahko pojavi rahlo draženje.

Po 21 dneh neprekinjene uporabe izdelka je priporočljivo, da ga 3 dni ne uporabljate.

Uporaba izdelka ni primerna za otroke, mlajše od 5 let. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Kot previdnostni ukrep je priporočljivo, da izdelka ne uporabljate med nosečnostjo ali dojenjem.

Če se pojavijo neželjeni učinki, prenehajte z uporabo izdelka. Če se simptomi nadaljujejo, se posvetujte s farmacevtom ali zdravnikom.

Izdelek hranite pri temperaturi do 25°C.

Po vsaki uporabi tubo pravilno zaprite.

Perskindol Active Cool Gel je uporaben do datuma, označenega na embalaži ob oznaki «EXP».

To navodilo za uporabo je bilo nazadnje revidirano: aprila 2023.

Izdelano v Švici

Proizvajalec VERFORA SA, Rte de Moncor 12, 1752 Villars-sur-Glâne, Švica

Zastopnik (Slovenija):

Ewopharma d.o.o.
Cesta 24. Junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
www.perskindol.si



Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG
Wolfgangasse 45-47, AT-1121 Wien