carbomed plus

SI

Carbomed Plus
dvoslojne tablete

Lajšanje simptomov zaradi napihnjenosti in vetrov.
Pomoč pri izločanju prebavnih plinov.

1. Sestava in namen uporabe medicinskega pripomočka

Carbomed Plus je medicinski pripomoček, ki lajša simptome zaradi napihnjenosti in vetrov v črevesju, ki so posledica nabiranja prebavnih plinov. *Carbomed Plus* deluje proti krčem in z njimi povezano bolečino ter preprečuje nastanek vetrov in napihnjenosti.

1.1. Mehanizem delovanja

Mehanizem delovanja izdelka temelji na učinku simetikona proti penjenju, v kombinaciji z delovanjem oglja na absorpcijo črevesnih plinov: delovanje izdelka tako temelji izključno na zakonih naravne mehanike. Dvoslojna tableta omogoča sproščanje približno 50 % sestavin v želodcu znotraj 15 minut po jemanju, popolnoma pa razpade tableta v črevesju v roku 1 ure. Sestavine se ne absorbirajo v prebavnem traktu in ne ovirajo absorpcije hranljivih snovi.

1.2. Sestava

Vsaka tableta vsebuje:
- 50 mg simetikona
- 300 mg oglja

Pomožne snovi: maltodekstrin, saharoza, mikrokristalna celuloza, hidroksipropilmetilceluloza, polivinilpirolidon, koloidni silicij, premrežena karmelozanatrij, polivinilpolipirolidon, glicerol behenat, silicijev dioksid, magnezijev stearat.

2. Vsebina pakiranja

Vsaka škatla vsebuje 20 dvoslojnih tablet za enkratno uporabo.

3. Odmerjanje in način uporabe

Odrasli: Priporočeno je jemanje 1-2 tablet po dveh glavnih obrokih, do največ 4 tablete na dan.
Mladostniki stari od 14 do 18 let: 1 tableta po dveh glavnih obrokih, do največ 2 tableti na dan.

Vzemite tableto iz pretisnega omota in jo popijte s kozarcem vode.

4. Neželeni učinki

V priporočenem odmerku se lahko zaradi prisotnosti oglja blato temneje obarva rjavo. To je fiziološki pojav in ne pomeni bolezenskega stanja. Pri daljši uporabi pomembni neželeni učinki niso znani. Izdelek nima negativnega vpliva na raven pozornosti. Lahko se pojavijo tudi neželeni učinki, ki se razlikujejo od navedenih: v primeru nepričakovanih neželenih simptomov se posvetujte z zdravnikom.

5. Medsebojno delovanje s prehranskimi dopolnili in zdravili

Absorpcijsko delovanje oglja in simetikona lahko neugodno vpliva na učinkovitost drugih zdravil, ki jih jemljete sočasno. V primeru sočasnega zdravljenja z drugimi izdelki, se posvetujte z zdravnikom preden vzamete ta izdelek. Simetikon lahko moti delovanje nekaterih reagentov, ki se uporabljajo v diagnostične namene, kot je gvajakov (*guaiac*) gumi.

6. Shranjevanje

Carbomed Plus shranjujte na suhem mestu, stran od virov toplote in svetlobe: pretisni omot odprite tik pred samo uporabo. Izdelka ne uporabljajte, če je ovojnina poškodovana.

Shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

carbomed plus

7. Opozorila in previdnostni ukrepi

Izdelek ni primeren za uporabo pri otrocih mlajših od 14 let.
Shranjujte nedosegljivo otrokom.
Izdelka ne smete uporabljati po izteku roka uporabnosti, ki je odtisnjen na škatli.
Ne jemljite v ležečem položaju.
Ne uporabljajte, če je ovojnina poškodovana.
Vsaka tableta je namenjena za enkratno uporabo. Potrebno jo je vzeti iz pakiranja neposredno pred jemanjem. Ne jemljite delno poškodovane tablete (zdrobljene ali prelomljene) ali predhodno vzete iz pretisnega omota ob neznanem času, ker takšna, nepravilna uporaba lahko predstavlja tveganje za kontaminacijo izdelka.
Ne uporabljajte, če imate prisotne želodčne ali črevesne lezije.
Ne uporabljajte v primeru zapore črevesja.
V primeru **nosečnosti ali dojenja**, se sme medicinski pripomoček uporabljati le, če je to potrebno in po predhodnem posvetu z zdravnikom.
Priporočenega odmerka ne smete prekoračiti, saj preveliki odmerki lahko povzročijo pojav neželenih učinkov.
Izdelka ne smete uporabljati dlje kot 30 zaporednih dni.
Če simptomi ne minejo, se posvetujte z zdravnikom.
Ne jemljite, v primeru intolerance na izdelek.
Ne jemljite v primeru znane preobčutljivosti na sestavine.

8. Rok uporabnosti

Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti, ki je odtisnjen na škatli.

Rok uporabnosti se nanaša na izdelek, ki je pravilno shranjen, v nepoškodovani ovojnini.

9. Odstranjevanje

Izdelek po izteku datuma roka uporabnosti, ali neporabljen izdelek, je potrebno odvreči skladno z lokalnimi predpisi. V nobenem primeru izdelka in embalaže ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke.

CE 0426 25°C

SIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Italija

Distributer za Slovenijo:
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ, d.o.o. Ljubljana,
Litostrojska Cesta 46a, 1000 Ljubljana, Slovenija

Datum zadnje revizije: junij 2025.

Pojasnilo simbolov na izdelku:

Simbol	Pojasnilo
	Glejte navodila za uporabo
	Rok uporabnosti
LOT	Številka serije
	Proizvajalec
	Za enkratno uporabo
25°C	Zgornja omejitev temperature
CE 0426	Oznaka CE_{0426} z referenčno številko priglašenega organa