

Uporaba / Upotreba

Novalac PLUS začetno mleko je primerno za dojenčke od rojstva do 6. meseca starosti, ko jih matere ne dojijo ali so le ti delno dojili. Uporabljajte ga lahko vse dokler dojenčka hranite po steklenički. Ko Novalac PLUS začetno mleko več ne nasiti dojenčka, svetujemo, da preidete na Novalac 1 začetno mleko. Po dopolnjenem 6. mesecu starosti svetujemo prehod na Novalac 2 nadaljevalno mleko. Novalac PLUS je del obsežne linije proizvodov, razvitih posebej za zadovoljevanje prehranskih zahtev dojenčkov. / *Novalac PLUS početna mliječna hrana primanjena je za hranjenje dojenčadi od rođenja do 6. meseca starosti, ako majka ne doji ili ako djelomično doji. Možete ju koristiti sve dok dojenčce hranite na bočicu. Ako Novalac PLUS početna mliječna hrana dovoljno ne zasićuje dojenčce, savjetujemo da prijedete na Novalac 1 početnu mliječnu hranu. Nakon 6 mjeseci starosti preporučujemo prijelaz na Novalac 2, prijelaznu mliječnu hranu. Novalac PLUS dio je opsežne linije proizvoda posebno razvijenih za zadovoljavanje prehranbenih potreba dojenčadi.*

Pomembno opozorilo / Važna napomena

Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke. Mleko Novalac se uporablja samo po nasvetu strokovnjakov s področja medicine, prehrane, farmacije ali druge strokovne osebe, ki je odgovorna za skrb matere in otroka. Posebna pozornost pri uporabi Novalac mleka je potrebna pri dojenčkih z oslabiljenim imunskim odzivom, nedonošenčkih ali novorojenčkih z nizko porodno težo ter v primeru alergijskih reakcij na mlečne beljakovine. Nepravilna priprava ali shranjevanje lahko predstavlja tveganje za zdravje. Pri hranjenju po steklenički poskrbite, da stik med mlekom in zobmi vašega otroka ni predolg ali pogost, ker to povečuje možnost za nastanek kariesa. Vedno umijte zobe vašega otroka po zadnjem nočnem obroku. / *Majčino mlijeko najbolja je hrana za dojenčad. Mliječna hrana za dojenčad koristi se samo prema preporukama stručnjaka s područja medicine, prehrane, farmacije ili druge stručne osobe odgovorne za zdravlje majke i djeteta. Poseban oprez kod uporabe mliječne hrane Novalac potreban je kod dojenčadi s oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine te kod alergijskih reakcija na mliječne bjelancevine. Nepravilna priprema ili čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Pri hranjenju na bočicu pazite da kontakt između mliječne hrane i zuba vašeg djeteta ne bude predug ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvijek operite zube djetetu nakon zadnjeg noćnog obroka.*

Odmerjanje / Doziranje

Starost dojenčca (mesece) / Starost dojenčeta (mjeseci)	0-1	1-2	2-4	4-6
Število obrokov na dan / Broj obroka na dan	6	5	5	4
Število meric za pripravo enega obroka / Broj mjerica za pripremu jednog obroka	3	4	5	7
Količina vode (ml) / Količina vode (ml)	90	120	150	210

Ko vrha napolnjena in do roba poravnana priložena merica vsebuje 4,3 g Novalaca PLUS. Eno merico raztopite v 30 ml vode. Dnevno količino hrane in število obrokov prilagodite dojenčkovim starosti in njegovim potrebam. Če zdravnik ne svetuje drugače, upoštevajte priporočila v tabeli. / *Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena mjerica sadržava 4,3 g Novalaca PLUS. Jednu mjericu rastopite u 30 ml vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama dojenčeta. Ako liječnik drugačije ne savjetuje, uvažite preporuke u tablici.*

• Vedno pripravite svež obrok. • Hranite na suhem mestu, zaščiten pred toploto in svetlobo. • Izdelek je uporaben najmanj do datuma, odtisnjenega na dnu pločevinke. • Po prvem odprtju pločevinke, morate vsebino porabiti v treh tednih. • Po vsaki uporabi pločevinke dobro zaprite. • Ne shranjujte nepoptega obroka. Ostanek zavrzite. / • *Uvijek pripremite sveži obrok. • Čuvajte na suhom mjestu, zaštićeno od svjetla i topline. • Proizvod je najbolje upotrijebiti do datuma odtisnutog na dnu limenke. • Nakon prvog otvaranja limenke sadržaj upotrijebite u roku od 3 tjedna. • Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite. • Ne čuvajte nepopijeni obrok. Ostatak bacite.*

Pakirano v kontrolirani atmosferi. / *Pakirano u kontroliranoj atmosferi.*

Sedež podjetja: UP Medi-Europa SA, Švica • Distributer: Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana | Sedište poduzeća: UP Medi-Europa SA, Švcarska • Kontakt za Hrvatsku: Medis Adria d.o.o., Buzinska cesta 58, 10010 Zagreb-Buzin, Hrvatska.

Proizvedeno v EU/Proizvedeno u EU.

MEDIS | www.novalac.si
www.novalac.hr



0-6 meseciv/
mjeseci

400 g e

Novalac Plus

Začetno mleko za dojenčke
Početna mliječna hrana
za dojenčad



Hranilna vrednost / Hranjiva vrijednost

Energijska vrednost / Energetska vrijednost	100 g	100 ml
	kcal	2121
Masčobe / Masti	g	26
- od tega nasićene masčobe /	g	12
- od kojih zasićene masne kiseline	g	4,5
- linolna kislina / linolna kiselina	g	405
- alfa linolenska kislina / alfa linolenska kiselina	mg	120
- DHA (dokozahexaenojska kislina /	mg	60
dokozahexaenska kiselina)	mg	8
- ARA (araidonska kislina / araidonska kiselina)	mg	56,8
Ogljikovi hidrati / Ugljikohidrati	g	56,8
- od tega sladkorji / od kojih šećeri	g	1,9
GOS (Galaktooligosaharidi)	g	1,3
Prehranske vlaknine / Vlakna	g	10,4
Beljakovine / Bjelancevine	µg	440
Vitamini	µg	11,2
A	mg	11,5
D	µg	60
E	mg	7,8
K	µg	60
C	mg	0,8
Tiamin	mg	1,2
Niacin	mg	0,5
Riboflavin	mg	0,5
B6	mg	0,5
Folna kislina / Folna kiselina	µg	80
Folat	µg-DFE	150
B12	µg	1,5
Biotin	µg	18
Pantotonska kislina / Pantotonska kiselina	mg	5
Minerali	mg	165
Natrij	mg	525
Kalij	mg	400
Klorid	mg	380
Kalcij	mg	240
Fosfor	mg	45
Magnezij	mg	4
Železo / Željezo	mg	0,3
Cink	mg	0,38
Baker / Bakar	mg	0,045
Mangan	mg	<0,06
Fluorid	µg	22
Selen	µg	95
Jod	µg	170
Holin / Kolin	mg	80
Inozitol	mg	40
Taurin / Taurin	mg	20
L-karnitin	mg	18,6
Nukleotidi	mg	2,4

Sestavine / Sastojci

Posneto mleko, mlečne beljakovine, rastlinska olja (palmovo, sojino, kokosovo, repično), laktoza, galaktooligosaharidi (mleko), ribje olje (DHA), trikalcijev citrat, emulgator (sojin lecitin), kalijev klorid, holin bitartrat, kalcijev klorid, dikalcijev fosfat, trikalcijev citrat, dinatrijev fosfat, L-tirozin, olje iz gljive Mortierella alpina (ARA), vitamini (natrijev L-askorbat, DL-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, kalcijev D-pantotenat, tiaminjev hidroklorid, retinilacetat, piridoksinjev hidroklorid, riboflavin, folna kislina, fitomenadiol, D-biotin, holekalciferol, cianokobalamin), natrijev klorid, trimagnezijev citrat, železov difosfat, taurin, inozitol, kalcijev hidroksid, L-tryptofan, magnezijev klorid, nukleotidi (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-karnitin, trinitratni citrat, cinkov sulfat, kalijev jodid, antioksidansi (ekstrakt tokoferol, askorbil palmitat), natrijev selenit, bakrov sulfat, manganol sulfat.

Navodila za pripravo / Uputa za pripremu



PRED VSAKO PRIPRAVO OBROKA SI UMIJTE ROKE. / PRIJE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKE.



Stekleničko in pokrovček z dudo prekuhajte v vodi. Vre naj vsaj 5 minut. / Bočicu i poklopac sa dudom prokuhajte u vodi. Neka ključa bar 5 minuta.



Vodo za pripravo obroka zavrite v pokritem lončku. Vre naj vsaj 5 minut. / Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokrivnom lončiću. Neka ključa bar 5 minuta.



Vodo v lončku ohladite na 40 °C in jo prelitate v stekleničko. / Vodu u lončiću ohladite na 40°C i prelite je u bočicu.



V stekleničko s priloženo merico vsujete predpisano število meric. / Upisite uobičaju propisani broj mjerica pomoću priložene mjerice.



Stekleničko zaprite in dobro pretresite, da se prašek popolnoma raztopi. / Bočicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno otopi.



Pripravljen obrok ohladite do mlačnega (37 °C), oz. dokler na koži ne čutite ne toplo ne hladno. / Pripremljeni obrok ohladite do mlagog (37°C), odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.